






## Het gewicht van hond of kat

Zeer mager	Ondergewicht	Ideaal gewicht	Overgewicht	Zwaarlijvigheid
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ribben, de ruggenwervels en de bekkenbeenderen zijn goed zichtbaar.</li> <li>• Er is sprake van een duidelijk verlies van spiermassa.</li> <li>• Op de borstkas is geen vetlaag te voelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ribben, de ruggenwervels en de bekkenbeenderen zijn zichtbaar.</li> <li>• De taille is duidelijk zichtbaar.</li> <li>• Op de borstkas is geen vetlaag te voelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ribben, de ruggenwervels en de bekkenbeenderen zijn niet zichtbaar, wel goed te voelen.</li> <li>• De taille is duidelijk zichtbaar.</li> <li>• Op de borstkas is een dunne vetlaag te voelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ribben, de ruggenwervels en de bekkenbeenderen zijn moeilijk te voelen.</li> <li>• De taille is niet zichtbaar.</li> <li>• Bij de ruggengraat en aan de staartbasis is een vetlaag zichtbaar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de borstkas, de ruggengraat en aan de staartbasis is een vetlaag duidelijk zichtbaar.</li> <li>• De taille is niet zichtbaar.</li> <li>• Er is een duidelijke toename van de buikomvang.</li> </ul>

Bron: het onderzoek\* naar gewicht is uitgevoerd in het Purina Pet Care Center in Gray Summit (Missouri, USA), door een team van wetenschappers onder leiding van dr. Richard Kealy van de Nestlé Purina Pet Nutrition Research Departement en verschillende onderzoekers van meerdere universiteiten. De 14 jaar durende studie, gestart in 1987 en afgerond in 2001, is de eerste afgeronde voedingsstudie die de complete levensduur bestrijkt van een groter zoogdier. \*Kealy RD et al.(2002), JAVMA, Vol 220: 1315-1320; Lawler DF et al. (2008), Br J Nutr. 99: 793-805